

EVALUATION OF IMMEDIATE AND DELAYED IMPLANTS SUPPORTING FIXED PARTIAL DENTURE

Thesis




*Submitted to the Faculty of Dentistry Minia University
in Partial Fulfillment for the Requirements
Of The Doctor Degree*

in

Fixed Prosthodontics

Presented by



Mohamed Abd-el Aziz Fahmy

Ass. Lecturer, Faculty of Dentistry Minia University
(B.D.S 1997, M.D.Sc. 2003 Alexandria University)

Faculty of Dentistry

Minia University

2008

الملخص العربي

تهدف هذه الرسالة الى تقييم التحميل الفوري و المؤجل للغرسات السنية حاملة الاستعاضة السنية الثابتة في حالات انعدام وجود الأسنان بالفك السفلي

تم تقسيم المرضى عشوائيا الى مجموعتين

المجموعة الأولى (خمسة مرضى)

تم تركيب عدد ست غرسات لكل مريض في هذه المجموعة في المنطقة ما بين الثقبين الذقنيين . تم تحميل الغرسات فوريا باستعاضة سنية مؤقتة ثابته. و تم التنبيه على المريض باخذ سوائل في الاسبوع الاول . بعد مرور اسبوع تم ازاله الغرز و السماح للمريض باخذ وجبات لينة

المجموعة الثانية (خمسة مرضى)

تم تركيب عدد ست غرسات لكل مريض في هذه المجموعة في المنطقة ما بين الثقبين الذقنيين. تم دفن الغرسات و غلق الجرح بالخيط الجراحي و ذلك بعد تثبيت مسامير اللثام. تم التنبيه على المريض باخذ سوائل في الاسبوع الاول . بعد مرور اسبوع تم ازاله الغرز و السماح للمريض باخذ وجبات لينة و تم تسليم المريض طقم ذو بطانه لينة كا تركييه مؤقته اثناء اللثام.

بعد مرور ثلاثة الى اربعة اشهر بعد الجراحه تم استدعاء جميع المرضى من المجموعتين لتسلم الاستعاضات الثابته ذات الاطراف المعلقة.

طرق التقييم

1- التقييم الاكلينيكي

أ- دليل حركة الغرسات

ب- الدليل اللثوي

ت- قياس عمق الجس اللثوي

2- التقييم الاشعاعي

تم تقييم المجموعتين اشعاعيا و ذلك باستخدام الاشعه حول جزريه العاديه

بعد وضع الغرسات مباشرتا وبعد تركيب الاستعاضات السنيةنهائيه ثم بعد

3,6,9,12 شهر و ذلك لقياس

أ- حجم العظم المتكون حول الغرسات

ب- كثافه العظم حول الغرسات

تم ترتيب النتائج فى جداول و تم تحليلها احصائيا

و من هذه الدراسة تم التوصل للاستنتاجات الآتية

1- الغرسات السنية المربوطة المحمله فوريا و الموضوعه فى منطقة ما بين
الثقبين الذقنيين لتدعم التركيبات الجزئيه الثابته احدثت تغير سلبي فى ارتفاع
العظم حول الغرسات فى المراحل الاولى من الالئام و المراحل الاولى من
المتابعه(3,6 اشهر)

2- وجد ان هناك زياده ملحوظه فى كثافه العظم حول الغرسات المحمله فوريا
فى المراحل الاولى من الالئام و المراحل الاولى من المتابعه(3,6 اشهر)